

お子さんが新型コロナウイルスに 感染したら

Miyagi Pediatric COVID-19 Team
宮城県小児コロナウイルス感染症対策チーム

お子さんがコロナウイルス感染症と診断されたら

①保健所（支所）から連絡が入ります。

- 検査を受けた医療機関に伝えた電話番号に連絡が入ります。
- 発症2日前からの行動をまとめておくとい良いでしょう。

②保健所がお子さんの状況を確認させていただきます。

- 現在の症状やこれまでの経過
- 通院中の病気の有無

③どこで療養するのかを決めます。

- お子さんの症状や下記の事項等をふまえ、保健所・行政が判断します。
 - ご家族で具合悪い方の有無
 - ご自宅で感染対策が可能か

* 仙台市の方は[仙台市の流れ](#)をご参照ください。保健所により一部異なります。

お子さんがコロナウイルス感染症と診断されたら

④必要と判断された場合は、医療機関を受診していただきます。

- お子さんの状況や通院中の病気等をふまえ、受診していただく場合があります。
- 受診する医療機関は保健所が調整します。

⑤健康観察をして報告いただきます。

- 毎日体調（体温、症状、食欲など）をチェックし、保健所に報告していただきます。
- 報告方法はオンライン入力あるいは電話自動応答となります。
- 参考として[仙台市の方法](#)を示します。

⑥濃厚接触者に関する説明をうけます。

- 同居家族は濃厚接触者に該当します。
- 一定期間、健康観察および自宅待機が必要となります。期間は保健所にご確認ください。
- 濃厚接触者が発症した際の指示を受けてください。

お子さんがコロナウイルス感染症と診断されたら

⑦幼稚園・保育園・学校等への連絡

- 園（学校）へ感染の連絡をする際、担当者へ下記をお伝えください。
 - 診断日
 - 発症日（保健所に確認してください）
 - 最終登園（登校）日
 - 療養終了予定日（もし保健所から伝えられていた場合）
- 保健所から園（学校）の担当者へ連絡が行く場合がある事をお伝えください。

お子さんがコロナウイルス感染症と診断されたら

診療した施設から電話等でお知らせが来る



保健福祉センター（保健所支所）からショートメール



指定されたリンク（URL）から基本情報を入力



担当保健所支所から電話で連絡が入る（連絡が翌日になる場合があります）



症状などの経過を元に、入院、宿泊療養、自宅療法の方針の連絡（ショートメール）がくる

※入力が難しい場合には電話での対応も可能です。

連絡が見つからない場合には保健所が訪問する場合がありますので、速やかに入力してください。

健康観察

- ・ My HER-SYS(マイハーシス)から自動音声電話がかかり報告する方法
 - ・ 宮城電子申請サービスにアクセスして入力する
- どちらで報告するかは、担当保健所支所から届くメールで確認ください。

体調の確認

- 1日2回検温をして、体調を観察してください。自宅療養の場合は健康状態把握のため、[クリニック](#) 等から連絡が入ります。
- 高熱の継続、咳、息苦しさなどの「[気を付けるべき症状](#)」に悪化があった場合 [はクリニック](#)（診療時間内）、[受診・相談センター](#)（コールセンター）または担当保健所支所に連絡してください（[困ったときの相談窓口一覧](#)）。

療養解除基準

【症状あり】発症日（=症状の出現日）から10日以上かつ症状軽快後72 時間経過または症状軽快後24時間以上空けて2回PCR等の検査を行い陰性

【症状なし】検体採取日から7 日経過後

※上記はあくまでも一つの基準です。担当保健所支所で確認してください。

自宅療養の注意点

生活上の注意点

- 感染拡大防止のためご本人は外出せず、自宅で過ごしてください。自宅内でも必要最小限の行動にとどめてください。
- ご家族など同居の方も、生活上必要な外出を除き、不要不急の外出は控えましょう。外出する場合はマスクを着用してください。
- 外部からの不要不急の訪問者は受け入れないようにしましょう。

同居者がいる場合

- タオルの共用を避け、可能な限り空間を分けて生活してください。
- マスクと手洗い、アルコール消毒を心がけてください。
- 手を触れる共用部分はアルコールで消毒しましょう。
- 使用したティッシュはビニール袋に入れて密封して廃棄してください。

自宅療養者等支援物品配送サービス

陽性の方で、食料品等のストックがなく、支援を希望される方を対象として、1週間程度の食料品・日用品の支援物品をご自宅に配送します。
原則、電子申請で申し込みください。

申し込み方法：電子申請：<https://bit.ly/3oF2SEQ>

右のQRコードも使用できます。

電話 022-214-1337（月曜日～金曜日 8：30～16：30）



気を付けるべき症状

- 38 度以上, 3 日間以上続いている
- ひどくだるそう
- 水分がとれない・母乳ミルクを飲まない
- 尿の回数がいつもより少ない

- 顔色が明らかに悪い
- 唇が紫色になっている
- いつもと違う, 様子がおかしい

- 咳や痰が続きひどくなっている
- 速い呼吸, 息をするのが大変そう
- 少し動くと苦しそう

- 肩で息をしている・ゼーゼーしている
- 胸やおなかがペコペコした息をする
- 鼻をピクピクさせながら息をする

- ぼんやりしている(反応が鈍い)
- もうろうとしている(反応がない・乏しい)

- 嘔吐や吐き気が続き, ひどくなっている
- 下痢が続いている



自宅療養：家庭看護のポイント

・お子さんの新型コロナウイルス感染症はほとんどの場合軽症ですが、「[気を付けるべき症状](#)」，特に呼吸のようす，意識，食欲に注意しましょう。気になる症状があるときは，落ち着いて，連絡先に相談しましょう。

・熱が高いとき

体温が高くても，機嫌がよく，食事もとれている場合には，水分をとらせて様子を見ましょう。38℃を越える熱のためにぐったりしている，食欲がない，という場合には，処方されている熱さまし（アンヒバ坐薬やアセトアミノフェン，カロナールなど）を使ってみましょう。手足が冷たいうちはまだ熱が上がるので，手足が温かくなって熱が上がりきったところで使うと効果的です。

・けいれんしたとき

熱が高いときに，手足をばたんばたん動かす，白目をむく，意識がない，などの状態になったときは熱性けいれんの可能性があります。落ち着いて，お子さんを横向きに寝かせ，吐いた場合に吐物で息ができなくならないように気を付けます。口に何か入れたり噛ませたりしてはいけません。けいれんが治まるまでの時間を測りましょう。多くは5分以内に止まります。治まったら，渡されている連絡先または[困ったときの相談窓口一覧](#)に電話で相談しましょう。5分たってもけいれんが続いているときは救急車を呼んでかまいません。

自宅療養：家庭看護のポイント

・吐いているとき

吐き気が少し治まったときに、ティースプーン1杯程度の経口補水液を飲ませてみましょう。これを5分おきに繰り返し、少しずつ間隔を短く、量を増やして行きましょう。多少吐いてしまっても、繰り返し飲ませると脱水になることを防げます。下記のOS-1などが効果的ですが、塩分を含んだスポーツドリンク、味噌汁、野菜スープ、チキンスープなどで代替しても良いでしょう

[お子さまが吐いたら、下痢をしたら | 経口補水液オーエスワン \(OS-1\) | 大塚製薬工場](#)

・咳がひどいとき

熱が下がり、回復期に入ると、たまった痰を出すために咳がひどくなる場合があります。処方された薬を内服させたり、加湿したり、背中に枕を入れて眠るなどの対応を試してみましょう。咳き込みが強くて吐いてしまう、食欲がなくなってしまう、ぜいぜいしておなかがぺこぺこことへこむ、オットセイの泣き声や犬の遠吠えのような変な音の咳が出る、などの症状があるときは連絡しましょう。

新型コロナウイルスに感染した

お子さんの自宅での観察とケアのポイント

お子さんが新型コロナウイルスに罹った場合、自宅療養ではどのような様子に注意して看病をするのがよいのかをまとめてみました。

発熱

37.5℃以上が一般的に発熱とされていますが、熱だけでなく全身の状態を観察します。



寒がっている時
手足が冷たい時は、
熱が上がっている途中
なので厚着にしたり、布団
を増やす、部屋を暖めるなど
て体を温めましょう。



手足が温かくなっている時は、
熱が上がりが止まった状態なので、
薄着にしたり、布団を減らし
たり、体を涼くさせましょう。
●氷枕や保冷剤で、首すじの下、
太もものつけ根などの太い血管が
冷やすのも方法の一つです。

熱性けいれんが起きた時



びっくりして驚いてしましますが、
お子さんのことを揺さぶったりせず、
周りに危険なものがあれば上げて、
時間を測りましょう。



保冷剤
ハカサセ
3枚づつ入れて下さい。

顔は横に向けて吐いた時にのどをつまらせないようにして下さい。

生後3ヵ月未満のお子さんが38℃以上の熱が出た時は、早めに受診した方がよいでしょう。

熱がある時には、脱水に気をつけましょう。

高い熱が出た時には汗もたくさんかいています。
体からは水分だけでなく塩分やミネラルが汗で出てしまします。
ただのお水やお茶を飲ませるよりも、塩分などを含んでいる経口補水液を
飲ませるとよいでしょう。ない時は、スポーツドリンク、野菜を煮たスープ、みそ汁
などを飲ませてもよいです。



尿量

▲半日以上(12時間)おしっこが出ていない時には、要注視しましょう。



水分もとれていない 元気がなくなったりしている。
いつもと違って青白い顔色、口唇が乾いてカサカサ、
話しかけても反応が悪い、目がうつろな感じ

このような様子の時には早めに受診して下さい。

嘔吐



下痢

1~2回ではなく頻回に起こる。その他にも強い腹痛、血が混
じる。尿が少ない上記の症状がある時は気をつけて下さい。

嘔吐後はすぐに水分を飲ませずに落ち着いてきたら、少しずつ始めます。
下痢が頻回の時には、脱水症状を引き起こしやすいので、水分を控え
ることなく、補給しましょう。オムツのお子さんはおしりのたれれも自己
なので、ぬるま湯でコットンなどを濡して洗ってあげてもよいでしょう。

食欲



のどの痛みや違和感、発熱や下痢などの時には、食欲がなくなり、
いつもと同じように飲んだり食べたりできないことも起こります。

下痢などで胃腸が弱っている時には、刺激の強いもの、油分の
多いものは避けて、おかゆやうどんのような消化のよいものを食べましょう。
のどが痛い時は、のどごしのよいもの、ゼリー、湯豆腐など食べやすいよう、

食べたがらない時は無理に食べさせず、食べたがる分だけあげましょう。
食事ができなくても、水分をとることができておしっこが出ていれば様子見でいいでしょう。

呼吸



呼吸の状態を確認するために、自宅療養の方に血液中の酸素飽和度を測
る「パルスオキシメーター」が貸し出されています。95%以下が受診の目安としていま
す。目で見てわかる呼吸の様子で、注意が必要なものが下記になります。



息をする際に
肩が上がったり
下がったりする

肩呼吸



息をする際に
鎖骨の上や
胸骨の上か
肋骨の上か
へこんでいる

陥没呼吸



息を吸う時、
鼻の穴がながり、
ピクピク、ピクピク
動いている

鼻翼呼吸

▲息苦しそうなお様子や呼吸の回数が多くて様子がおかしい時には早めに受診しましょう。

咳

咳にも種類があり、乾いた咳や痰のからんだ咳、そして下記のような咳があります。
のどが炎症を起して腫れている。空気の通り道が狭くなってしまうと、息苦しくなるの
で注意が必要です。



犬の鳴き声の様な
高い音の咳
いつも閉めかけた
音がする


呼吸するのが辛い時は、



上半身を起こして
布団を丸めておた
れがからたり、
座椅子に座たり
楽になる姿勢を
とりましょう。



咳ととも、
「ヒューヒュー」
「ゼーゼー」
フエラムキを吹く
ような音が
胸に響く



口唇の色 これらも
青白く
なっている
時は、
舌のつけ根の色、
血中の酸素が少ない時

▲もし、意識がなくなったら、すぐに119番で
救急車を呼んで下さい。



息をしていない時には、
おお向けにしてあごの先を
持ち上げて頭を後ろに反らして
極端に息を吐き出さない
ように注意して下さい。
気道確保して下さい。

長い期間の新型コロナウイルス感染症の自宅療養は、感染予防にも気を遣うので看病は
不安も多くなると思います。症状の悪化の際には担当の保健所やかかりつけ医に相談を
しましょう。

困ったときの相談窓口一覧

- ・ 宮城県

「受診・相談センター（コールセンター）」 24 時間 022-398-9211

保健所から案内されている電話番号（保健所・自宅療養者フォローアップセンター）

- ・ 仙台市 保健福祉センター（保健所支所）

青葉区保健福祉センター 022-225-7211（代表）

宮城野区保健福祉センター 022-291-2111（代表）

若林区保健福祉センター 022-282-1111（代表）

太白区保健福祉センター 022-247-1111（代表）

泉区保健福祉センター 022-372-3111（代表）

- ・ [こども夜間安心コール](#)

自宅療養のポイント リンク集

- [コロナウイルス感染症と診断されたら（かわむらこどもクリニック）](#)
- [陽性と診断された方へ 仙台市ウェブサイト](#)
- [新型コロナウイルス感染症と診断された方へ - 宮城県公式ウェブサイト](#)
- [自宅療養のポイント（国立成育医療研究センター）](#)
- [自宅療養で感染を広げないために（東京都ハンドブック）](#)

お子さまの一日も早いご回復をお祈りしています！